

تاریخ تهیه: ۹۵/۰۵/۱۰ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴	دستور العمل تعویض اتصالات بیماران	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز معاونت درمان - مدیریت پرستاری
--	---	---

زمان تعویض	عنوان	سیستم
هر ۷۲ ساعت (در صورت فلبیت، درد و... زودتر تعویض شود).	آنژیوکت	درجۀ خون
هر ۲۴ ساعت، بعد از تزریق فرآورده های چربی یا آمینوآسیدی و آلبومین بلافاصله دور انداخته شود.	ست سرم	
هر ۷۲ ساعت - پس از شیمی درمانی و هیپرایلمنتاسیون بلافاصله تعویض شود.	میکروست	
هر ۷۲ ساعت با آنژیوکت	تری وی / سه راهی آنژیوکت	
پس از هر بار تزریق خون	ست خون	
باتل سرم بدون افزودن دارو و در صورت اتصال به میکروست هر ۷۲ ساعت با میکروست تعویض شود. باتل سرم تزریقی و شستشو هر ۲۴ ساعت	باتل سرم	
هر ۲۴ ساعت	اکستشن تیوب / ست K	
هر ۷۲ ساعت	هپارین لاک	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی (عفونت، انسداد و...)	کات دان	
هر ۱۲-۶ ساعت، یا در صورت تعویض ویال	ست پروپوفول	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی (عفونت، انسداد و...)	کاترورید مرکزی	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی (عفونت، انسداد و...)	کاتتر شریان مرکزی	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی (عفونت، انسداد و...)	کاتتر نافی	
با اتمام داروی داخل سرنگ	سرنگ متصل به پمپ انفوزیون	
هر ۲۴ ساعت	سرم هایپر تونیک / حاوی الکترولیت	
توصیه کارخانه سازنده، قبل از هر بار استفاده ضد عفونی محل کشیدن دارو	ویال مولتیپل دوز	
بلافاصله بعد از برداشتن مقدار داروی مورد نیاز دور انداخته شود. پوشش گازی استریل هر ۲۴ ساعت - در صورت خیس شدن در اسرع وقت - پوشش شفاف استریل هر ۷ روز	ویال سینگل دوز پانسمان کاتتر CVC	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی (عفونت، انسداد و...) حداکثر ۱۴ روز	سوند ادراری داخلی	اداری
حداکثر ۴۸ ساعت	سوند اکسترنال	
همزمان با تعویض فولی (در صورت نشستی و پارگی تعویض شود).	کیسه ادراری	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی - حداکثر ۱۴ روز	لوله تراشه	تنفسی
اختصاصی برای هر بیمار - ۲۴ ساعت	تیوب ساکشن	
در نوع بازیگبار مصرف - در نوع بسته در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیوب	کاتتر ساکشن (بسته و باز)	
اختصاصی برای هر بیمار - حداکثر ۷ روز	لوله خرطوم و ونتیلاتور	
اختصاصی برای هر بیمار - هر ۲۴ ساعت	فیلتر HME	
اختصاصی برای هر بیمار - در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیوب	کاتتر و ماسک اکسیژن	
در صورت پر شدن	چست باتل	
در صورت خیس شدن - در صورت آلودگی واضح	پانسمان چست تیوب	
هر ۲۴ ساعت	کاتتر مانت	
در صورت وجود اندیکاسیونهای بالینی	سوند معده	گوارش
هر ۲۴ ساعت	سرنگ گاوآژ و چست لیدها	متفرقه
انتخاب سایز و حجم متناسب با میزان مصرف و تولید پسماند تیز و برنده	سیفتی باکس	
۲۸ روز	ویال انسولین	
توصیه کارخانه سازنده	شربت های دارویی	
بلافاصله بعد از باز شدن	محلول های تزریقی پروتئینی	

توصیه کارخانه سازنده	قطره ها	
۲۴ ساعت	آمینواسید - اینترالیپید	

ترجیحا " تاریخ اتصالات درکاردکس ثبت گردد.

منابع :

1. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2021
2. Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing, 10th edition. 2015
3. Guideline for the prevention of Catheter- associated Urinary Tract infection , HSE Health Protection Surveillance Centre, 2011.
4. Guideline for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Bloodstream Infections, CDC, 2011.
5. IFIC Basic Concepts of Infection Control, 2th Edition, 2011.
6. Guidline Wong' s clinical manual of pediatric Nursing, 8th edition. 2011