



۲۱-۲۲ دی ماه ۱۴۰۱
کرج- ایران

چهارمین کنگره ملی گزارش های موردی بالینه



کد مقاله


شکم حاد

فاطمه کریمی*، کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
مریم آژیده، کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

شکم حاد، وضعیتی در شکم می باشد که با درد ناگهانی و شدید همراه است و معمولاً به دلیل عفونت، تورم و سوراخ شدن احشا مخصوصاً روده، انسداد روده و یا اختلال در خونرسانی احشای داخل شکم رخ می دهد.

بیمار خانم ۵۹ ساله با شکایت سرفه، تنگی نفس، ضعف و بی حالی با علائم حیاتی: BP:174/91، PR:102، T:38.3، RR:22، SPO2:93% به تریاژ بیمارستان مراجعه کرده است. بیمار سابقه فشارخون، چربی خون، سنگ کلیه، نفروکتومی کلیه چپ ۸ سال قبل و جراحی هرنی ناف را ذکر کرده است. سابقه مصرف داروهای لوذارتان، آلوپرینول، فاموتیدین، ملاتونین و همچنین حساسیت به پنی سیلین را نیز داشته است. با توجه به جواب آزمایشات درخواستی در بدو ورود، urea=200، cr=9.5، pcr rapid =Positive، Troponin=Negative بود. پزشک متخصص داخلی بعد از معاینه مددجو درخواست مشاوره نفرولوژی داد. پس از انجام مشاوره نفرولوژی بیمار به مدت دو ساعت با دور ۲۵۰ و صافی Lf دیالیز شد. با توجه به درد شکمی شدید و داشتن تندرین در هنگام لمس، آژیده بودن بیمار و سابقه جراحی هرنی که ذکر کرده است، توسط پزشک معالج معاینه و درخواست مشاوره جراحی اورژانسی و سونوگرافی داده شد که در سونوگرافی انجام شده، نفروکتومی چپ، هاپرتروپی جبرانی کلیه راست و در سمت چپ ناحیه رتروپریتونال کالکشن با حدود نامشخص با گسترش به ناودان پاراپلوپیک چپ و لگن گزارش شد. طی هماهنگی و تماس پزشک معالج با آنکال جراحی استان بعد از انجام گرافی ایستاده و خوابیده شکمی بیمار با آمبولانس کددار به بیمارستان مقصد اعزام شد. بلافاصله بیمار با تشخیص شکم حاد تحت عمل جراحی قرار گرفت و در سرویس جراحی در بخش مراقبت ویژه بیمارستان مقصد بستری شد.

در ارزیابی بیماران مشکوک به شکم حاد، در قدم اول گرفتن شرح حال کامل از درد های شکمی و همچنین محل درد، ماهیت درد و سابقه انجام اعمال جراحی شکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین کنترل علائم حیاتی و شرایط همودینامیک بیمار معاینه های بالینی، درخواست آزمایشات روتین، گرافی های شکمی و همچنین سونوگرافی کامل شکم و لگن در تشخیص دقیق تر می توانند کمک کننده باشند.



شکم حاد