



۲۱-۲۲ دی ماه ۱۴۰۱
کرج- ایران

چهارمین کنگره ملی گزارش‌های موردی بالینی



کد مقاله


فشار خون بالا و خونریزی مغزی

صاحبه اکبری*: کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
آرزو مصلحی: کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
سمیرا متین نژاد: کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
نرگس تقی پور: کارشناس ارشد پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
اعظم عابدی: کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

فشار خون بالا می‌تواند در مدت طولانی، دیواره‌های رگ‌های خونی را تضعیف کند. فشار خون بالایی که درمان نشده است یکی از علل قابل پیشگیری خونریزی مغزی است.

فشار خون بالا می‌تواند در مدت طولانی، دیواره‌های رگ‌های خونی را تضعیف کند. فشار خون بالایی که درمان نشده است یکی از علل قابل پیشگیری خونریزی مغزی است.

خونریزی در داخل یا اطراف مغز است. علل خونریزی یا هموراژ مغزی شامل فشار خون بالا، عروق خونی غیرطبیعی ضعیف که دچار نشت هستند، سوء مصرف مواد مخدر و ضربه مغزی می‌باشند. بسیاری از افرادی که خونریزی مغزی را تجربه می‌کنند، علائمی مانند سکتة مغزی دارند و ممکن است دچار ضعف در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا بی‌حسی باشند. دشواری در انجام فعالیت‌های معمول، از جمله مشکلات در راه رفتن و یا حتی افتادن، علائمی غیر معمول نیستند. حدود ده درصد از تمام موارد سکتة‌های مغزی به صورت هموراژیک هستند یا در اثر خونریزی در مغز ایجاد می‌شوند. جهت تشخیص افتراقی مسمومیت‌ها با سایر اختلالات، معاینات دقیق بالینی و تصویربرداری به موقع بسیار حائز اهمیت می‌باشد.



خونریزی در داخل یا اطراف مغز است. علل خونریزی یا هموراژ مغزی شامل فشار خون بالا، عروق خونی غیرطبیعی ضعیف که دچار نشت هستند، سوء مصرف مواد مخدر و ضربه مغزی می‌باشند. بسیاری از افرادی که خونریزی مغزی را تجربه می‌کنند، علائمی مانند سکتة مغزی دارند و ممکن است دچار ضعف در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا بی‌حسی باشند. دشواری در انجام فعالیت‌های معمول، از جمله مشکلات در راه رفتن و یا حتی افتادن، علائمی غیر معمول نیستند. حدود ده درصد از تمام موارد سکتة‌های مغزی به صورت هموراژیک هستند یا در اثر خونریزی در مغز ایجاد می‌شوند. جهت تشخیص افتراقی مسمومیت‌ها با سایر اختلالات، معاینات دقیق بالینی و تصویربرداری به موقع بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه: فشار خون، مسمومیت، خونریزی مغزی